

کد کنترل

258

E



258E

نام:
نام خانوادگی:

محل امضا:



«ماگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
(امام خمینی (ره))

صبح جمعه

۱۳۹۶/۱۲/۴

دفترچه شماره (۱)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) - سال ۱۳۹۷

رشته زیست‌شناسی گیاهی - فیزیولوژی (کد ۲۲۲۰)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۰۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: فیزیولوژی گیاهی - سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل (ریخت‌شناسی، تشریح، ریخت‌زایی و اندام‌زایی) - جذب و انتقال در گیاهان - متابولیسم گیاهی - فتوسنتز	۱۰۰	۱	۱۰۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق چاپ و انتشار سؤالات به هر روش با فناوریهای نوین و یا پس از هر تغییری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با نقض این امر مجازات و تعقیبات قانونی خواهد بود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

۱- نشانگان مشترک کمبود فسفر و روی کدام است؟

- (۱) انباشت آنتوسیانین و کلروز برگ‌ها
(۲) انباشت آنتوسیانین و کوچک ماندن برگ‌ها
(۳) کلروز برگ‌های جوان و مرگ رأس شاخساره
(۴) کلروز برگ‌های مسن و مرگ رأس شاخساره

۲- در مسیر جذب و تحلیل گوگرد، نقش دو آنزیم APS ردوکتاز و آ-استیل سرین تیولیز کدام است؟

- (۱) تشکیل سولفیت و سیستئین
(۲) تشکیل سولفید و آ-استیل سرین
(۳) تشکیل فسفوآدنوزین فسفوسولفات (PAPS) و سرین
(۴) تشکیل فسفوآدنوزین فسفوسولفات (PAPS) و سیستئین

۳- مسیر انتقال الکترون در آنزیم نیترات ردوکتاز ریشه گیاهان کدام است؟

- (۱) $\text{NAD(P)H} \leftarrow \text{FAD} \leftarrow \text{سیتوکروم} \leftarrow \text{مولیبدن} \leftarrow \text{نیترات}$
(۲) $\text{NAD(P)H} \leftarrow \text{سیتوکروم} \leftarrow \text{FAD} \leftarrow \text{مولیبدن} \leftarrow \text{نیترات}$
(۳) $\text{NAD(P)H} \leftarrow \text{مولیبدن} \leftarrow \text{FAD} \leftarrow \text{سیتوکروم} \leftarrow \text{نیترات}$
(۴) $\text{NAD(P)H} \leftarrow \text{مولیبدن} \leftarrow \text{سیتوکروم} \leftarrow \text{FAD} \leftarrow \text{نیترات}$

۴- عملکرد OEC وابسته به حضور چه یون‌هایی در این کمپلکس است؟

- (۱) Mg^{++} و K^{+}
(۲) Zn^{++} و Cl^{-}
(۳) Ca^{++} و Cl^{-}
(۴) Zn^{++} و Mn^{++}

۵- اندامک‌های دخیل در بروز «اثر واربورگ» کدامند؟

- (۱) کلروپلاست، پراکسی‌زوم، گلی‌اکسی‌زوم
(۲) میتوکندری، پراکسی‌زوم، کلروپلاست
(۳) میتوکندری، کلروپلاست، گلی‌اکسی‌زوم
(۴) واکونل، پراکسی‌زوم، کلروپلاست

۶- کدام دسته از آنزیم‌های زیر در مسیر گلوکونئوز سلول‌های گیاهی فعالیت دارند؟

- (۱) پیرووات کیناز و فسفوفروکتوکیناز
(۲) پیرووات دکربوکسیلاز و فسفوفروکتوکیناز
(۳) فروکتوز ۱ و ۶ بیس فسفاتاز و پیرووات کیناز
(۴) فروکتوز ۱ و ۶ بیس فسفاتاز و PEP کربوکسی کیناز

- ۷- در مورد تجزیه آب در فتوسنتز، کدام صحیح است؟
 (۱) اسید آمینه تیروزین (Y_p) ۴ الکترون را از ۲ مولکول آب جدا کرده و اکسیژن آزاد می‌شود.
 (۲) با گرفته شدن ۴ الکترون از ۲ مولکول آب توسط ۴ اتم Mn، آب تجزیه می‌شود.
 (۳) دو اتم Mn از خوشه منگنز با مولکول‌های آب در ارتباط هستند و تغییر ظرفیت می‌دهند.
 (۴) در هر مرحله از فرضیه حالت S یک الکترون و یک پروتون هم‌زمان از مولکول آب جدا می‌شوند.
- ۸- در مورد عوامل نسخه‌برداری (ARF) (Auxin Response Factor) کدام مورد درست است؟
 (۱) در حضور اکسین توسط پروتئین‌های مهارکننده تخریب می‌شوند.
 (۲) در غیاب اکسین توسط پروتئین‌های مهارکننده تخریب می‌شوند.
 (۳) به اکسین متصل می‌شوند و عامل مهار نسخه‌برداری ژن‌های پاسخگر به اکسین هستند.
 (۴) به اکسین متصل نمی‌شوند و عامل مهار نسخه‌برداری ژن‌های پاسخگر به اکسین هستند.
- ۹- کدام یک از ترکیبات زیر پس از تخریب می‌تواند به عنوان منبع سیتوکینین در سلول‌های گیاهی مورد استفاده قرار گیرد؟
 (۱) مشتق متیلی تیدیاژورون
 (۲) مشتقات گلیکوزیلی بنزیل آمینوپورین
 (۳) RNAهای گیاهی دارای ترانس - زاتین
 (۴) RNAهای گیاهی دارای سیس - زاتین
- ۱۰- انتقال قطبی اکسین‌ها چگونه انجام می‌شود؟
 (۱) وابسته به انرژی و مستقل از جاذبه و توسط PIN پروتئین‌ها
 (۲) غیروابسته به انرژی و جاذبه و توسط PIN پروتئین‌ها
 (۳) غیروابسته به انرژی و جاذبه و توسط همبرهای پروتونی AUX1
 (۴) وابسته به انرژی و جاذبه و توسط همبرهای پروتونی AUX1
- ۱۱- تیره‌های Poaceae, Juncaceae و Cyperaceae از لحاظ شکل رویشی گندمی نامیده می‌شوند. ویژگی ساقه مشخصه Poaceae کدام است؟
 (۱) میانگره‌ها توخالی، ساقه با مقطع گرد
 (۲) میانگره‌ها توپر، ساقه‌ها با مقطع مثلثی
 (۳) میانگره‌ها منورم، ساقه‌ها با حلقه‌های سالیانه
 (۴) فاقد میانگره، ساقه با مقطع چهار گوش
- ۱۲- در کدام یک از گیاهان زیر دانه دارای آریل (aril) است؟
 (۱) Poaceae (۲) Taxaceae (۳) Taxodiaceae (۴) Zannicheliaceae
- ۱۳- کدام تیره از راسته میخک‌سانان (Caryophyllales) با گوشواره‌های غشایی در محل گره‌ها (Ochrea) متمایز می‌شود؟
 (۱) Aizoaceae (۲) Chenopodiaceae (۳) Polygonaceae (۴) Plumbaginaceae
- ۱۴- کدام سرده با *Acantholimon* خویشاوند است؟
 (۱) *Acanthophyllum* (۲) *Acanthus* (۳) *Leontodon* (۴) *Plumbago*
- ۱۵- کدام سرده (جنس) به تیره Cistaceae تعلق دارد و راسته این تیره کدام است؟
 (۱) *Melilotus* / راسته Fabales (۲) *Helichrysum* / راسته Asterales
 (۳) *Heliotropium* / راسته Boraginales (۴) *Helianthemum* / راسته Malvales
- ۱۶- کدام ترتیب صعودی رتبه‌ها در آرایه‌شناسی گیاهی صحیح است؟ (از راست به چپ)
 (۱) Class, Order, Family, Genus (۲) Class, Order, Family, Species
 (۳) Family, Order, Class, Genus (۴) Phylum, Order, Class, Family

- ۱۷- کدام سرده متعلق به تیره سنجیدیان (Elaeagnaceae) است؟
 (۱) *Daphne* (۲) *Hippophae* (۳) *Vaccinium* (۴) *Chrozophora*
- ۱۸- در کدام مورد سرده‌های معرفی شده همگی متعلق به تیره *Crassulaceae* (گل نازیان) هستند؟
 (۱) *Hamamelis*, *Aconium*, *Sedum* (۲) *Saxifraga*, *Aconium*, *Heuchera*
 (۳) *Sedum*, *Kalanchoe*, *Rossularia* (۴) *Saxifraga*, *Rossularia*, *Sedum*
- ۱۹- سرده (جنس) *Corydalis* بر اساس نظام‌های رده‌بندی اخیر (APG) در کدام تیره قرار می‌گیرد؟
 (۱) *Fumariaceae* (۲) *Papaveraceae* (۳) *Podophyllaceae* (۴) *Ranunculaceae*
- ۲۰- کدام آرایه‌ها (تاکسون) ساختار گلی نسبتاً مشابه دارند ولی بر اساس تعداد برگه‌ها (follicles) از هم قابل تفکیک هستند؟
 (۱) *Adonis* - *Ranunculus* (۲) *Anemone* - *Aquilegia*
 (۳) *Clematis* - *Ceratocarpus* (۴) *Delphinium* - *Consolida*
- ۲۱- ویژگی گیاهان بادگرده‌افشان کدام است؟
 (۱) تولید شهد (۲) جام گل نامتقارن (۳) گل‌اذین کپه‌ای (۴) گل‌اذین دم‌گربه‌ای
- ۲۲- در دانه‌های پریسپرم‌دار اندوخته دانه از کدام بافت منشأ می‌گیرد؟
 (۱) اندوسپرم (۲) اسکوتلوم (۳) بافت خورش (۴) لپه‌ها
- ۲۳- مقدار سلولز و لیگنین به ترتیب در کدام بخش دیواره، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است؟
 (۱) دیواره اولیه - دیواره اولیه (۲) دیواره اولیه - دیواره ثانویه
 (۳) دیواره ثانویه - دیواره ثانویه (۴) دیواره ثانویه - دیواره اولیه
- ۲۴- Bulliform Cells، سلول‌های حبابی شکل واقع در سطح پهنک برگ می‌باشند.
 (۱) تحتانی - نک‌لیه‌ای‌ها (۲) تحتانی - دولپه‌ای‌ها (۳) فوقانی - تک‌لیه‌ای‌ها (۴) فوقانی - دولپه‌ای‌ها
- ۲۵- در بازدانگان ابتدایی به ترتیب لقاح و گامت‌نر از چه نوعی است؟
 (۱) پلانوتگامی - متحرک (۲) سیفونوتگامی - متحرک (۳) پلانوتگامی - بی‌حرکت (۴) سیفونوتگامی - بی‌حرکت
- ۲۶- چنانچه یک گیاه روزبلند در شرایط نامناسب القاء گل‌دهی قرار گیرد، تا چه مرحله‌ای امکان بازگشت به فاز رویشی را دارد؟
 (۱) ابتدای مرحله برانگیختگی (۲) انتهای مرحله برانگیختگی
 (۳) بنیان‌گذاری اندام‌های گل (۴) تشکیل پریمور دیوم اندام‌های گل
- ۲۷- کدام یک از لایه‌های میکروسپورانژ نهان‌دانگان در شکافتگی بساک نقش دارد؟
 (۱) *Epiderm* (۲) *Endothecium* (۳) *Middle layer* (۴) *Tapetum*
- ۲۸- محل اصلی فتوسنتز در برگ‌های غوطه‌ور کجاست؟
 (۱) اپیدرم (۲) پارانشیم اسفنجی
 (۳) پارانشیم نرده‌ای (۴) پارانشیم نرده‌ای و اسفنجی
- ۲۹- در گل‌اذین سنبله، کدام فلس‌ها پوشاننده سنبلچه می‌باشند؟
 (۱) لما (۲) گلوم (۳) گلومل (۴) گلوملول
- ۳۰- بازدانگی تعدیل‌شده در کدام گروه گیاهی زیر دیده می‌شود؟
 (۱) سرخس و کاج (۲) سیکاس و زنکیو (۳) کاج و سرو (۴) گنوم و افدرا

- ۳۱- قطر کدام غشا بیشتر از بقیه است؟
 (۱) پلاسمالما (۲) تونوپلاست
 (۳) شبکه آندوپلاسمی (۴) قطر غشاها تفاوت محسوسی ندارد.
- ۳۲- پایین ترین نقطه ذوب متعلق به کدام یک از اسیدهای چرب است؟
 (۱) اولئیک (۲) استئاریک (۳) لینولیک (۴) لینولینیک
- ۳۳- میزان جذب فرم هیدراته کدام یون از بقیه کمتر است؟
 (۱) لیتیم (۲) پتاسیم (۳) سدیم (۴) سزیم
- ۳۴- ضریب انعکاس (Reflection coefficient) کدام یک از ترکیبات غیرالکترولیت زیر در غشای سلولی والونیا برابر با یک است؟
 (۱) اوره (۲) گلیسرول (۳) گلوکز (۴) سوکروز
- ۳۵- ناقل HMA4 در ترابری کدام یون دخالت دارد؟
 (۱) کادمیوم (۲) آهن (۳) مس (۴) منگنز
- ۳۶- ناقل ZIP4 در کدام غشا مستقر است و در ترابری کدام یون شرکت می کند؟
 (۱) پلاستیدی و روی (۲) واکونلی و آهن (۳) پلاستیدی و آهن (۴) غشای پلاسمایی و روی
- ۳۷- ژن های BOR، SKOR و SOSI به ترتیب رمزسازی ترابریهای کدام یک از یونها را بر عهده دارند؟
 (۱) پتاسیم - برم - گوگرد (۲) گوگرد - برم - پتاسیم (۳) سدیم - بور - پتاسیم (۴) پتاسیم - بور - سدیم
- ۳۸- کدام گزینه معرف نقش سمی Ni برای گیاهان است؟
 (۱) نقش کوناکتوری برای آنزیم اوره از (۲) تشکیل کمپلکس پایدار با هیستیدین و سترات
 (۳) نقش تنظیم کننده در آنزیم متیل کوا - M - ردوکتاز (۴) تشکیل کمپلکس پایدار با Fe - هیدروژناز
- ۳۹- تحمل به کدام عنصر سنگین از طریق سکونستر کردن آن در واکونل سلول گیاهی انجام می شود؟
 (۱) روی (۲) مس (۳) آهن (۴) نیکل
- ۴۰- جایگاه های حساس به جیوه (Ag) و اسیدیته (pH) در ساختمان آکواپورین کدامند؟
 (۱) سیستئین واقع در لوپ E و سرین لوپ D (۲) سرین لوپ D و آرژینین لوپ B
 (۳) سیستئین واقع در لوپ E و هیستیدین در لوپ D (۴) آرژینین لوپ B و هیستیدین لوپ E
- ۴۱- کدام گزینه نقش آمینواسید آرژینین در موتیف NPA در ساختمان منفذ آکواپورین را نشان می دهد؟
 (۱) ایجاد میدان الکتروستاتیک برای انتقال یک طرفه آب
 (۲) کمک به انتقال مولکول هایی غیر از آب نظیر آمونیاک
 (۳) ایجاد میدان الکتروستاتیک برای عبور مولکول های گلیسرین
 (۴) جهت دهی به مولکول های آب
- ۴۲- کدام گزینه در مورد ترانسپورترهای (ناقلین) بورون صحیح است؟
 (۱) BoR4 و BoR1 مسئول جذب فعال و MIP مسئول دفع آن است.
 (۲) BoR4 مسئول دفع فعال بورون، BoR1 مسئول جذب فعال و MIP5 مسئول انتشار تسهیل شده آن است.
 (۳) BoR1 مسئول دفع فعال، BoR4 مسئول جذب فعال و MIP مسئول انتشار تسهیل شده آن است.
 (۴) BoR1 و MP مسئول جذب فعال و MIP مسئول انتشار تسهیل شده آن است.
- ۴۳- کدام گزینه نقش ناقلین MIP را نشان می دهد؟
 (۱) انتقال Si و Ni (۲) انتقال N و B (۳) انتقال B و Si (۴) انتقال Si و Ni

- ۴۴- در ارتباط با عملکرد کانال‌های پتاسیمی، کدام عبارت صحیح است؟
 (۱) نیماز با وانادات موجب باز شدن روزنه‌های هوایی می‌شود.
 (۲) تیمار برگ با ABA (آبسیزیک اسید) موجب خروج پتاسیم از سلول‌های نگهبان روزنه شده و روزنه‌ها بسته می‌شوند.
 (۳) باز شدن کانال‌های پتاسیمی جهت جذب پتاسیم به درون سلول‌ها با دیلاریزاسیون غشای پلاسمایی انجام می‌گیرد.
 (۴) در همه گیاهان به هنگام باز شدن روزنه هوایی Cl^- ، K^+ در سلول‌های نگهبان روزنه انباشته می‌شود.
- ۴۵- در ارتباط با بیوسنتز ATP توسط پمپ‌های نوع F-ATPase کدام صحیح است؟
 (۱) آزادی ATP، در حالت باز (O) صورت می‌گیرد. (۲) آزادی ATP در حالت محکم (T) اتفاق می‌افتد.
 (۳) ساخت ATP در حالت باز (O) صورت می‌گیرد. (۴) ساخت ATP در حالت سست (L) اتفاق می‌افتد.
- ۴۶- در فعال‌سازی پمپ پروتون غشاء پلاسمایی توسط پروتئین ۱۴:۳:۳ کدام صحیح است؟
 (۱) فسفریلاسیون باقیمانده آسپارتیک اسید مقدم است.
 (۲) فسفریلاسیون باقیمانده سرین مقدم است.
 (۳) فسفریلاسیون باقیمانده آسپارتیک اسید بعد از اتصال به پروتئین اتفاق می‌افتد.
 (۴) فسفریلاسیون باقیمانده سرین بعد از اتصال به پروتئین اتفاق می‌افتد.
- ۴۷- در مورد نقش ناقل‌های ABC در گیاهان کدام صحیح است؟
 (۱) مصرف ATP به شکل غیرمستقیم
 (۲) انتقال علف‌کش‌ها به خارج از سلول
 (۳) انتقال مواد به واکوئل بعد از همیوگ شدن با گلوکاتینون (۴) انتقال آنوسیانیل‌های آزاد به واکوئل
- ۴۸- در مورد منطقه تهی (depletion zone) در خاک، کدام صحیح است؟
 (۱) درخصوص فسفر وسیع‌تر از نترات می‌باشد.
 (۲) توسط همزیستی میکوریزایی کاهش می‌یابد.
 (۳) منطقه‌ای که در آن عناصر غذایی موردنیاز گیاه جذب می‌شود.
 (۴) منطقه‌ای از خاک است که در آن عناصر غذایی وجود ندارد.
- ۴۹- ریشه یک گیاه در محیطی که غلظت یون x برابر با یک میلی‌مولار بوده، قرار داده شده است. بعد از مدتی غلظت درون سلولی یون ۲۱ میلی‌مولار اندازه‌گیری شده است. محاسبه با استفاده از رابطه نرنست این غلظت را ۱۴۰/۰ میلی‌مولار پیش‌بینی کرده بود. کدام روند اتفاق افتاده است؟
 (۱) انتشار تسهیل شده یون
 (۲) جذب با انتشار ساده
 (۳) جذب فعال یون
 (۴) دفع فعال یون
- ۵۰- در بستن روزنه کدام کانال پتاسیم بیشترین نقش را به ترتیب در خروج K^+ از واکوئل و از سلول ایفا می‌کنند؟
 (۱) NHX و کانال شیکر
 (۲) کانال‌های شیکر و SKOR
 (۳) GORK و TPK
 (۴) TPK و GORK
- ۵۱- جذب ریشه‌ای آهن با چه سازوکاری انجام می‌گیرد؟
 (۱) در دولپه‌ای‌ها به صورت یون Fe^{III} و با ناقلین IRT1 انجام می‌شود.
 (۲) در دولپه‌ای‌ها به صورت یون Fe^{II} و با ناقلین IRT1 انجام می‌شود.
 (۳) در گندمیان به صورت یون Fe^{II} و با ناقلین YSI انجام می‌شود.
 (۴) در گندمیان به صورت یون Fe^{III} و با ناقلین YSI انجام می‌شود.
- ۵۲- کدام ناقل عامل جذب سدیم در شرایط شوری است؟
 (۱) NHX
 (۲) ناقلین HAK/KUP/KT
 (۳) کانال‌های شیکر
 (۴) کانال‌های HKT

- ۵۳- در مورد سمزدایی عناصر فلزی سنگین کدام درست است؟
 (۱) سمزدایی مس (Cu) با انباشتنی آن در واکوئل همراه است.
 (۲) سمزدایی روی (Zn) با انباشتنی آن در واکوئل همراه است.
 (۳) سمزدایی مس (Cu) با همبند شدن آن با فیتوکلانتین همراه است.
 (۴) سمزدایی روی (Zn) با همبند شدن آن با فیتوکلانتین همراه است.
- ۵۴- ویژگی پمپ پروتون ($H^+ - ATPase$) غشای تونوپلاستی، کدام است؟
 (۱) یک زیرواحدی است و با نیترات بازداشته می شود. (۲) یک زیرواحدی است و با وانادات بازداشته می شود.
 (۳) چند زیرواحدی است و با وانادات بازداشته می شود. (۴) چند زیرواحدی است و با نیترات بازداشته می شود.
- ۵۵- آنزیم گلوکان واتردی کیناز کدام واکنش را در مسیر تجزیه نشاسته کاتالیز می کند؟
 (۱) فسفریلی کردن کربن شماره ۱ در آمیلوز (۲) فسفریلی کردن کربن شماره ۳ در آمیلوز
 (۳) فسفریلی کردن کربن شماره ۳ در آمیلوکتین (۴) فسفریلی کردن کربن شماره ۶ در آمیلوکتین
- ۵۶- فسفریلاسیون در سطح مهرمایه در کدام یک از واکنش های مسیر گلیکولیز روی می دهد؟
 (۱) تبدیل ۱ و ۳ بیس فسفوگلیسرات به گلیسرات و تولید پیرووات از فسفوانول پیرووات
 (۲) تبدیل فروکتوز به فروکتوز ۶ فسفات و تولید پیرووات از فسفوانول پیرووات
 (۳) تبدیل فروکتوز به فروکتوز ۶ فسفات و تولید فروکتوز ۱ و ۶ بیس فسفات از فروکتوز ۶ فسفات
 (۴) تبدیل گلوکز به گلوکز ۶ فسفات و تولید ۱ و ۳ بین فسفوگلیسرات از گلیسرآلدئید ۳ فسفات دهیدروژناز
- ۵۷- کدام دسته از آنزیم های زیر در مسیر گلیکولیز و چرخه کالوین مشترک هستند؟
 (۱) هگزوکیناز و الدولاز
 (۲) فسفوگلیسرات کیناز و فروکتوز ۱ و ۶ - بیس فسفاناز
 (۳) گلیسرآلدئید ۳ - فسفات دهیدروژناز و فسفوگلیسرات موناز
 (۴) گلیسرآلدئید ۳ - فسفات دهیدروژناز و فسفوگلیسرات کیناز
- ۵۸- آلفا - کتوگلو تارات در کدام مرحله از واکنش های تنفس تولید می شود و پیش ساز آن چه ترکیبی است؟
 (۱) چرخه کربس - ملات
 (۲) چرخه کربس - گلو تامات
 (۳) چرخه گلی اکسالات - سوکسینات
 (۴) مسیر پنتوز فسفات اکسیداتیو - گلیسرآلدئید ۳ - فسفات
- ۵۹- آنزیم فسفوفروکتوکیناز وابسته به ATP (PFK) در سلول های گیاهی چگونه تنظیم می شود؟
 (۱) افزایش غلظت سیتوسلی PEP، مهار کننده آنزیم است.
 (۲) افزایش غلظت ارنو فسفات، مهار کننده آنزیم است.
 (۳) افزایش غلظت فروکتوز ۲ و ۶ - بیس فسفات، فعالیت آنزیم را تحریک می کند.
 (۴) همانند سلول های جانوری افزایش غلظت ATP، فعالیت آنزیم را در سلول های گیاهی مهار می کند.
- ۶۰- شکافت یا تجزیه پروتئولیتیک در تنظیم فعالیت کدام آنزیم در سلول های گیاهی نقش دارد؟
 (۱) پروتئین کیناز A (۲) پیرووات دهیدروژناز
 (۳) گلو تامین سنتناز (۴) گلیسرآلدئید ۳ - فسفات دهیدروژناز
- ۶۱- کدام یک از پروتئین های زیر دارای ساختار EF-hand متصل شونده به کلسیم هستند؟
 (۱) پروتئین های شبه کالمودولین (۲) پروتئین فسفاتاز های وابسته به کلسیم
 (۳) کانال های غشایی اندامکی کلسیم (۴) پمپ های Ca-ATPase غشای پلاسمایی

- ۶۲- تغییر در پیکربندی در ساختار یک آنزیم آلوستریک در نتیجه تغییر کووالان بر کدام یک از عوامل زیر تأثیر می‌گذارد؟
 (۱) تأثیر بر ثابت‌های ترمودینامیکی واکنش بدون تأثیر بر nH
 (۲) تغییر در ثابت‌های سینتیکی واکنش بدون تغییر در nH
 (۳) تغییر در ثابت‌های سینتیکی واکنش و nH
 (۴) تغییر در حساسیت آنزیم به اثر کننده آلوستریک بدون تأثیر بر ثابت‌های سینتیکی واکنش
- ۶۳- افزایش مورد نیاز در غلظت گهرمایه برای افزایش چند برابری در سرعت واکنش یک آنزیم آلوستریک ناشی از کدام یک از موارد زیر است؟
 (۱) افزایش تعاونیت بین زیرواحدها و در نتیجه $nH = 1$
 (۲) افزایش تعاونیت بین زیرواحدها و در نتیجه $nH > 1$
 (۳) وجود تنظیم کننده‌های آلوستریک جورگرا و در نتیجه $nH \leq 1$
 (۴) وجود تنظیم کننده‌های آلوستریک ناجورگرا و در نتیجه $nH < 1$
- ۶۴- غلظت گهرمایه برای اغلب آنزیم‌ها در شرایط فیزیولوژیک در داخل سلول چه مقدار است؟
 (۱) بیشتر از $S_{0.5}$
 (۲) بیشتر از ارزش K_m
 (۳) برابر با ارزش K_m
 (۴) نزدیک به ارزش K_m
- ۶۵- کدام یک از آنزیم‌های زیر از طریق فسفریلی کردن آنزیم ساکارز فسفات سنتتاز سیتوسولی، فعالیت آن را در تاریکی مهار می‌کند؟
 (۱) کیناز $SnRK1$
 (۲) یک کیناز وابسته به کلسیم
 (۳) یک پروتئین کیناز وابسته به $cAMP$
 (۴) یک پروتئین کیناز وابسته به کلسیم و کالمودولین
- ۶۶- کدام دسته از آنزیم‌های زیر ویژه چرخه گلی‌اکسالات در گلی‌اکسیزوم در سلول‌های دانه‌های روغنی می‌باشند؟
 (۱) ایزوسیترات لیاز و ملات سنتتاز
 (۲) ایزوسیترات لیاز و ملات سنتتاز
 (۳) ایزوسیترات لیگاز و ملات سنتتاز
 (۴) سیترات لیاز و ملات سنتتاز
- ۶۷- ایزوفرم دیمری فسفوفروکتوکیناز وابسته به پیروفسفات، آنزیم تنظیمی کدام مسیر است و اثر کننده آلوستریک آن کدام است؟
 (۱) گلوکونوژنز - پیروفسفات
 (۲) گلوکونوژنز - ارنوفسفات
 (۳) گلیکولیز - فسفوانول پیروات
 (۴) گلیکولیز - فروکتوز ۲ و ۶ - بیس فسفات
- ۶۸- مسیر اکسیداتیو پنتوزفسفات چگونه در تاریکی و یا نور تنظیم می‌شود؟
 (۱) مهار آنزیم گلوکز ۶ - فسفات دهیدروژناز در نور توسط سیستم تیوردوکسین
 (۲) فعال شدن آنزیم گلوکز ۶ - فسفات دهیدروژناز در نور توسط سیستم تیوردوکسین
 (۳) فعال شدن آنزیم گلوکز ۶ - فسفات دهیدروژناز در تاریکی به واسطه فسفریلاسیون
 (۴) مهار آنزیم گلوکز ۶ - فسفات دهیدروژناز در تاریکی به واسطه فسفریلاسیون
- ۶۹- در صورت کاهش نسبت غلظت $NADP^+$ به O_2 فتوسنتزی، در زنجیر انتقال الکترون فتوسنتزی چه واکنشی رخ می‌دهد؟
 (۱) انتقال الکترون به مخزن پلاستوکوئینون
 (۲) انتقال الکترون به کمپلکس سیتوکروم b_6f
 (۳) انتقال الکترون به O_2 و تولید H_2O_2
 (۴) بازگشت الکترون از FNR به سیتوکروم b

- ۷۰- آنزیم ساکارز فسفات سنتاز، آنزیم کلیدی مسیر بیوستنز ساکارز چگونه تنظیم می شود؟
- (۱) کاهش فعالیت در نتیجه تنظیم ردوکس در تاریکی
 - (۲) کاهش فعالیت در نتیجه فسفریلاسیون در تاریکی
 - (۳) افزایش فعالیت در نتیجه فسفریلاسیون در نور
 - (۴) افزایش فعالیت در نتیجه وجود اثرکننده آلوستریک گلوکز ۱ - فسفات
- ۷۱- در گیاهان تراریخته فاقد ناقل تریوزفسفات در کلروپلاست کدام فرایند زیر اتفاق می افتد؟
- (۱) تراز ساکارز در سیتوسل افزایش می یابد.
 - (۲) تراز تریوزفسفات ها در کلروپلاست ها کاهش می یابد.
 - (۳) تجزیه نشاسته و صدور قندها از کلروپلاست به سیتوسل افزایش می یابد.
 - (۴) صدور هگزوزفسفات ها از کلروپلاست به سیتوسل کاهش می یابد.
- ۷۲- در صورتی که در یک واکنش آنزیمی، تعدیل کننده (effector) موجب افزایش Km واکنش شود، کدام عبارت زیر صحیح است؟
- (۱) آنزیم آلوستریک هموتروپیک بوده و تعدیل کننده یک بازدارنده می باشد.
 - (۲) آنزیم آلوستریک و هتروترپیک بوده و تعدیل کننده یک فعال کننده می باشد.
 - (۳) آنزیم آلوستریک هتروترپیک بوده و تعدیل کننده یک بازدارنده می باشد.
 - (۴) آنزیم آلوستریک هموتروپیک بوده و تعدیل کننده یک فعال کننده می باشد.
- ۷۳- تشکیل کمپلکس آنزیم - سوبسترا برای افزایش سرعت واکنش آنزیمی، از کدام طریق تسهیل می شود؟
- (۱) از طریق کاتالیز اسید - بازی
 - (۲) برهم کنش های کووالان بین آنزیم و سوبسترا
 - (۳) برهم کنش های غیر کووالان بین آنزیم و سوبسترا
 - (۴) با مشارکت یون فلزی در اتصال آنزیم و سوبسترا
- ۷۴- کدام گروه از آنزیم های زیر در گیاهان C₄ واکنش دیکربوکسیلاسیون اکسیداتیو را کاتالیز می کنند؟
- (۱) PEP کربوکسی کیناز - Pi پیروات دی کیناز
 - (۲) NAD⁺ - مالیک آنزیم - PEP کربوکسی کیناز
 - (۳) NADP⁺ - مالیک آنزیم - PEP کربوکسی کیناز
 - (۴) NADP⁺ - مالیک آنزیم - NAD⁺ مالیک آنزیم
- ۷۵- کدام عبارت فیتوکروم ها را به عنوان پذیرنده های نوری توصیف می کند؟
- (۱) سرین - ترئونین کینازهای خود فسفریلی کننده وابسته به نور قرمز هستند.
 - (۲) هیسئیدین کینازهای خود فسفریلی کننده وابسته به نور قرمز هستند.
 - (۳) کینازهای فعال شده با نور قرمز هستند که عوامل رونویسی MYB را فسفریلی می کنند.
 - (۴) کینازهای فعال شده با نور قرمز دور هستند که عوامل رونویسی PIF3 را فسفریلی می کنند.
- ۷۶- نقش پروتئین CPI2 در متابولیسم کربن در چرخه کربن کدام است؟
- (۱) در تشکیل کمپلکس ابر مولکولی گلیسرآلدئید ۳ فسفات دهیدروژناز و فسفوریبولوکیناز نقش دارد.
 - (۲) در تشکیل کمپلکس ابر مولکولی گلیسرآلدئید ۳ فسفات دهیدروژناز و فسفوفروکتوکیناز نقش دارد.
 - (۳) در تشکیل کمپلکس ابر مولکولی گلیسرآلدئید ۳ فسفات دهیدروژناز و فروکتوز بیس فسفاتاز نقش دارد.
 - (۴) در تشکیل کمپلکس ابر مولکولی گلیسرآلدئید ۳ فسفات دهیدروژناز و ۳ فسفوگلیسرات کیناز نقش دارد.

۷۷- خوشه منگنز کمپلکس OEC حاوی چند اتم منگنز است و چه تعداد از این اتم‌ها در انتقال الکترون هنگام شکست آب مشارکت دارند؟

(۱) ۲ و ۳ (۲) ۲ و ۴ (۳) ۴ و ۳ (۴) ۴ و ۴

۷۸- طی تبدیل حالت $S_0 \rightarrow S_1$ در کمپلکس آزادکننده اکسیژن، تعداد الکترون‌ها و پروتون‌های آزادشده چقدر است؟

(۱) فقط یک الکترون (۲) یک پروتون، یک الکترون (۳) دو پروتون، یک الکترون (۴) دو الکترون، یک پروتون

۷۹- فراوانی نسبی دو فتوسیستم در غشاهای فتوسنتزی چگونه است؟

(۱) در یوکاریوت‌ها فراوانی هر دو فتوسیستم در غشاء یکسان است.

(۲) در یوکاریوت‌ها فراوانی PSII بیشتر از PSI است.

(۳) در پروکاریوت‌های فتوسنتزی فراوانی PSI بیشتر از PSII است.

(۴) در پروکاریوت‌های فتوسنتزی فراوانی PSII بیشتر از PSI است.

۸۰- در شدت نور کم، کدام یک از واکنش‌های زیر در چرخه گزانتوفیل روی می‌دهد؟

(۱) اپوکسیداسیون آنتراگزانترین به ویولاگزانترین و تولید آب

(۲) اپوکسیداسیون زآگزانتین به ویولاگزانترین و مصرف اکسیژن فتوسنتزی

(۳) داپوکسیداسیون آنتراگزانترین به زآگزانتین و اکسیداسیون آسکوربات

(۴) داپوکسیداسیون زآگزانتین به ویولاگزانترین و مصرف H^+ و NADPH

۸۱- به کدام دلیل، در تنفس نوری طی چرخه‌های کربن و نیتروژن، مجموع نیتروژن آلی بدون تغییر باقی می‌ماند؟

(۱) دامیناسیون دو مولکول گلیسین در پراکسیزوم سنتز گلوتامات در میتوکندری را پشتیبانی می‌کند.

(۲) دامیناسیون مولکول سرین در میتوکندری سنتز گلوتامین در پراکسیزوم را پشتیبانی می‌کند.

(۳) تولید نیتروژن معدنی در پراکسیزوم، سنتز گلوتامات در کلروپلاست را پشتیبانی می‌کند.

(۴) نیتروژن معدنی تولید شده در میتوکندری، سنتز گلوتامات در کلروپلاست را پشتیبانی می‌کند.

۸۲- در ساختار ابرکمپلکس فتوسیستم II در گیاهان عالی، آنتن داخلی از چه پپتیدهایی تشکیل شده است؟

(۱) یک مولکول از هر یک از پپتیدهای CP_{24} و CP_{23} (۲) یک مولکول از هر یک از پپتیدهای CP_{27} و CP_{22}

(۳) دو مولکول از هر یک از پپتیدهای CP_{24} و CP_{23} (۴) دو مولکول از هر یک از پپتیدهای CP_{27} و CP_{22}

۸۳- تنظیم فعالیت پیرووات اروتوفسفات دی‌کیناز در گیاهان C_4 چگونه انجام می‌شود؟

(۱) فعال‌سازی از طریق فسفریلی شدن وابسته به P_i

(۲) غیرفعال‌سازی از طریق فسفریلی شدن غیروابسته به ADP

(۳) غیرفعال‌سازی توسط پروتئین فسفاتاز دو عملکردی در روشنایی

(۴) فعال‌سازی از طریق تنظیم پس ترجمه‌ای یک ترئونین کیناز - فسفاتاز

۸۴- کدام مورد با ویژگی‌های مرحله II در متابولیسم CAM سازگار است؟

(۱) آغاز خروج ملات از واکوئل و بیشینه فعالیت PEPCase

(۲) کاهش فعالیت PEPCase و افزایش فعالیت روبیسکو

(۳) توقف فعالیت PEPCase و بیشینه فعالیت روبیسکو

(۴) دکربوکسیلاسیون ملات و آغاز فعالیت PEPCase

- ۸۵- زیرواحد کوچک روبیسکو چگونه بر فعالیت این آنزیم تأثیر می‌گذارد؟
 (۱) افزایش تخصص‌یافتگی آنزیم برای CO_2
 (۲) تسهیل کاربامیلاسیون آنزیم
 (۳) جلوگیری از اتصال CAIP
 (۴) مشارکت در تشکیل جایگاه کاتالیزوری
- ۸۶- محل سنتز کلروفیل در گیاهان عالی کدام است؟
 (۱) فقط در استرومای کلروپلاست
 (۲) در غشاهای نیلاکونیدی استرومایی
 (۳) در غشاهای تیلاکونیدی گرانومی
 (۴) در پوش درونی کلروپلاست و در استرومای کلروپلاست
- ۸۷- در شرایط نوری کم طبق نظریه حالت گذار (Transition State) چگونه انرژی در یافتی بین دو فتوسیستم توزیع می‌شود؟
 (۱) برگشت LHCII_b به PSII به دلیل فعال شدن کیناز اختصاصی
 (۲) بی‌فسفریلی شدن LHCII به دلیل ایجاد شرایط احیایی در خزانه PQ
 (۳) فعال شدن فسفاتاز اختصاصی و برگشت $\text{LHCII}_{a,b}$ به PSII
 (۴) فعال شدن کیناز اختصاصی به دلیل افزایش اشکال اکسید شده در خزانه PQ
- ۸۸- کدام مورد کارایی توزیع انرژی بین دو فتوسیستم را افزایش می‌دهد؟
 (۱) جدایی PSII و PSI در غشاهای تیلاکونیدی
 (۲) سینتیک کند انتقال الکترون در PSI
 (۳) سینتیک سریع انتقال الکترون در PSII
 (۴) کم بودن میزان انلاف انرژی در PSII
- ۸۹- در تنظیم بیان ژن‌های LHCP، کدام عامل نقش علامتی دارد؟
 (۱) Mg پروتوپورفیرین IX و Mg کلاتاز
 (۲) اوروپورفیرینون III و فیتول
 (۳) پروتوپورفیرین IX و Fe کلاتاز
 (۴) کوپروپورفیرینون III و Mg کلاتاز
- ۹۰- تنظیم نوری کدام آنزیم‌ها در چرخه احیایی کربن فتوسنتزی به تغییرات غلظت یون Mg^{2+} استروما وابسته است؟
 (۱) ربیولوز ۵- فسفات کیناز و ترانس کتولاز
 (۲) سدوهپتولوز ۱ و ۷- بیس فسفاتاز و آلدولاز کلروپلاستی
 (۳) فروکتوز ۱ و ۶- بیس فسفاتاز و فسفوریبولوکیناز
 (۴) فروکتوز ۱ و ۶- بیس فسفاتاز و گلیسرآلدئید ۳- فسفات دهیدروژناز
- ۹۱- کدام مورد در رابطه با بازده کوانتومی فتوسنتز (Φ) صحیح است؟
 (۱) تعداد فراورده‌های فتوشیمیایی به ازای هر مولکول O_2 آزاد شده است.
 (۲) نسبت یک مولکول CO_2 به ازای ۲۵۰۰ مولکول کلروفیل در سازگان‌های نوری است.
 (۳) با تعداد فراورده‌های فتوشیمیایی رابطه عکس و با تعداد کل کوانتوم‌های جذب شده نسبت مستقیم دارد.
 (۴) با تعداد فراورده‌های فتوشیمیایی رابطه مستقیم و با تعداد کل کوانتوم‌های جذب شده نسبت عکس دارد.
- ۹۲- نقش سیتوکروم b در کمپلکس Cytb_f زنجیره انتقال الکترون کلروپلاستی کدام است؟
 (۱) موجب انتقال الکترون بین پروتئین ریسک (Rieske) و سیتوکروم f می‌شود.
 (۲) موجب انتقال الکترون بین پلاستوکوئینول و پلاستوسیانین می‌شود.
 (۳) با انتقال الکترون به پلاستوکوئینون موجب نفوذ گردونه پلاستوکوئینون می‌شود.
 (۴) با انتقال الکترون به سیتوکروم f موجب کاهش تراز سمی کوئینون در مخزن پلاستوکوئینون می‌شود.
- ۹۳- کدام عامل سبب کاهش فعالیت روبیسکو می‌شود؟
 (۱) اتصال سست CAIP به شکل کار با میله آنزیم
 (۲) اتصال سست RUBP به شکل غیر کار با میله آنزیم
 (۳) اتصال محکم RUBP به شکل غیر کار با میله آنزیم
 (۴) اتصال محکم RUBP به شکل کار با میله آنزیم

- ۹۴- کدام یک از آنزیم‌های زیر در مسیر سنتز ساکارز نقش کلیدی دارند و چگونه تنظیم می‌شود؟
 (۱) فروکتوز ۲ و ۶- بیس فسفاتاز - مهار توسط P_i
 (۲) فروکتوز ۶- فسفات ۲- کیناز - مهار توسط تربوزفسفات‌ها
 (۳) فروکتوز ۱ و ۶- بیس فسفاتاز - مهار توسط فروکتوز ۲ و ۶- بیس فسفات
 (۴) فروکتوز ۶- فسفات کیناز وابسته به بیروفسفات - مهار توسط فروکتوز ۲ و ۶- بیس فسفات
- ۹۵- در نور کم و یا در تاریکی کدام عامل سبب کاهش فعالیت آنزیم ADP- گلوکز پیروفسفریلاز کلروپلاستی در مسیر بیوسنتز نشاسته می‌شود و به کدام دلیل؟
 (۱) افزایش غلظت P_i به دلیل کاهش میزان سنتز ATP
 (۲) کاهش غلظت گلوکز ۱- فسفات به دلیل کاهش فعالیت فتوسنتز
 (۳) غیرفعال‌سازی آنزیم به دلیل تبدیل شکل هتروترامر به شکل هتروودی‌مر
 (۴) غیرفعال‌سازی آنزیم به دلیل تعدیل ردوکس توسط سیستم تیوردوکسین
- ۹۶- در نور شدید فسفریلاسیون کدام باقیمانده آمینواسیدی در LHCII سبب جابه‌جایی آن شده و انرژی نورانی به کدام یک از سازگان‌های نوری انتقال می‌یابد؟
 (۱) ترئونین - PSI (۲) تیروزین - PSI (۳) ترئونین - PSII (۴) تیروزین - PSII
- ۹۷- در مسیر بیوسنتز رنگیزه‌های فتوسنتزی فیکوبیلین‌ها در جلبک‌های سبز - آبی و جلبک‌های قرمز، متالوپورفیرین هم به چه ماده‌ای تبدیل می‌شود و توسط کدام آنزیم واکنش انجام می‌شود؟
 (۱) هم‌اکسیداز - بیلی‌وردین IX_a (۲) هم‌اکسیژناز - بیلی‌وردین IX_a
 (۳) هم دی‌اکسیژناز - بیلی‌وردین IX_a (۴) هم ردوکناز - دی‌هیدروبیلی‌وردین IX_a
- ۹۸- توازن بین چرخه کالوین و چرخه فتوسنتزی اکسیداتیو C_4 به وسیله کدام عوامل زیر تعیین می‌شود؟
 (۱) دما و pH استروما (۲) نور و سطح کاربامیلایسون روبیسکو
 (۳) غلظت CO_2 و O_2 و تغییرات pH استروما (۴) ویژگی‌های سینتیکی روبیسکو و غلظت CO_2 و O_2
- ۹۹- در مورد سهم ΔpH و ΔE در سنتز ATP در اندامک‌های میتوکندری و کلروپلاست، کدام عبارت صحیح است؟
 (۱) در میتوکندری سهم ΔpH و در کلروپلاست سهم ΔE بیشتر می‌باشد.
 (۲) در میتوکندری سهم ΔE و در کلروپلاست سهم ΔpH بیشتر می‌باشد.
 (۳) در هر دو اندامک ΔpH عامل اصلی می‌باشد.
 (۴) در هر دو اندامک ΔE عامل اصلی است.
- ۱۰۰- کدام گزینه در مورد توان تشخیص آنزیم‌های فتوسنتزی در برابر ایزوتوپ ^{13}C گاز دی‌اکسید کربن صحیح است؟
 (۱) در روبیسکو بیش از PEP کربوکسیلاز است.
 (۲) در روبیسکو بیش از 7% است.
 (۳) در PEP کربوکسیلاز بیش از 9% است.
 (۴) در هر دو آنزیم روبیسکو و PEP کربوکسیلاز یکسان است.