

225

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

بانک مقالات ایران

مرکز دانش و مقالات

علمی و پژوهشی و

سئوالات آزمونها

www.edub.ir

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره دکتری (نیمه متمرکز) داخل - سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی فارماکولوژی دامپزشکی (کد ۲۷۲۲)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (فارماکولوژی دامپزشکی - میکروبیولوژی - سم شناسی - بیماری های دام، طیور و آبزیان)	۹۰	۱	۹۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفندماه - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و یا متغییرین برابر مقررات رفتار می شود.

فارماکولوژی دامپزشکی:

- ۱- کدام یک از تتراسایکلین‌های زیر جذب خوراکی بهتری نسبت به بقیه دارند؟
 (۱) تتراسایکلین (۲) داکسی‌سیکلین (۳) اکسی‌تتراسایکلین (۴) کلر تتراسایکلین
- ۲- کدام یک از داروهای زیر با مهار سنتز پروتئین باکتریایی کلرامفنیکل تداخل اثر دارد؟
 (۱) اریتروماپسین (۲) تتراسایکلین (۳) انروفلوکساسین (۴) جنتامایسین
- ۳- تحریک گیرنده‌های β_1 قلبی موجب ایجاد کدام یک از اثرات زیر می‌شود؟
 (۱) افزایش ضربان و نیروی انقباضی قلب همراه با کاهش مصرف اکسیژن
 (۲) کاهش ضربان و نیروی انقباضی همراه با کاهش مصرف اکسیژن
 (۳) افزایش ضربان و نیروی انقباضی قلب همراه با افزایش فشار خون
 (۴) افزایش ضربان و نیروی انقباضی قلب همراه با تنگ شدن رگ‌های کرونر
- ۴- تجویز کدام یک از داروهای شل کننده عضلاتی زیر می‌تواند موجب افزایش سطح پتاسیم سرم شود؟
 (۱) دکامتونیم (۲) آتراکوریوم (۳) دی‌توبوکورالین (۴) گلامین
- ۵- به منظور مقید ساختن و مهار حیوانات بزرگ جنه باغ وحش معمولاً کدام یک از ترکیبات اویپوئیدی زیر به کار می‌رود؟
 (۱) اتورفین (۲) بوتورفانول (۳) پنتازاسین (۴) نالبوفین
- ۶- به منظور ایجاد «Neuroleptic analgesia» معمولاً از کدام یک از داروهای زیر استفاده می‌شود؟
 (۱) فتوتیازین‌ها و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (۲) اویپوئیدها و بوتیروفنون‌ها
 (۳) فتوتیازین‌ها و داروهای گلوکوکورتیکوئیدی (۴) اپیونیدها و بنزودیازپین‌ها
- ۷- کدام دارو در درمان «کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک» در گربه‌ها کاربرد دارد؟
 (۱) نیتروگلیسرین (۲) دیگوکسین (۳) فنی‌توئین (۴) دپلتیازم
- ۸- کدام یک از محلول‌های وریدی، دارای اثر قلبیایی کنندگی است؟
 (۱) رینگر (۲) دکستروز ۵٪ (۳) رینگر لاکتاته (۴) نرمال سالین
- ۹- کدام یک از جمله‌های زیر در مورد سرنوشت متابولیت‌های گلوکوکورتیکوئیدی داروها که وارد صفرا می‌شوند صحیح است؟
 (۱) به‌طور کامل و به همان شکل همراه با مدفوع دفع می‌شوند.
 (۲) وارد سیکل کبدی - روده‌ای شده و به‌طور کامل در ادرار دفع می‌شوند.
 (۳) مجدداً توسط کبد هیدرولیز شده و سپس وارد سیکل کبدی - روده‌ای می‌شوند.
 (۴) ممکن است در روده هیدرولیز شده و داروی اصلی باز جذب شود.
- ۱۰- فراوان‌ترین ترکیب دارویی موجود در گیاهان کدام است؟
 (۱) صمغ‌ها (۲) آلکالوئیدها (۳) رزین‌ها (۴) گلیکوزیدها
- ۱۱- مکانیسم اثر ضد باکتریایی Enrofloxacin کدام است؟
 (۱) مهار آنزیم DNA gyrase (۲) مهار سنتز دیواره سلولی
 (۳) مهار سنتز پروتئین (۴) اختلال در یکپارچگی غشاء سلولی
- ۱۲- نحوه اثر داروهای ضد قارچ Azole کدام است؟
 (۱) مهار سنتز پروتئین (۲) مهار سنتز کلسترول غشاء
 (۳) مهار متابولیسم اسیدهای نوکلئیک (۴) مهار سنتز ارگوسترول غشاء

- ۱۳- کدام عبارت در مورد داروی دوبوتامین، (Dobutamine) درست است؟
 (۱) به میزان یکسان موجب افزایش نیروی انقباضی و ضربان قلب می‌شود.
 (۲) نیروی انقباضی قلب را بیشتر از ضربان آن افزایش می‌دهد.
 (۳) افزایش ضربان قلب ناشی از آن بر اثر گشاد کنندگی عروقی غالب است.
 (۴) اثر گشاد کنندگی آن بر افزایش نیروی انقباضی و ضربان قلب غالب است.
- ۱۴- کدام یک در مورد اثرات چشمی پیلوکارپین صحیح است؟
 (۱) اتساع مردمک همراه با فلج تطابق
 (۲) اتساع مردمک همراه با انقباض عضلات صاف جسم مژگانی
 (۳) تنگی مردمک همراه با شل شدن عضلات صاف جسم مژگانی
 (۴) تنگی مردمک همراه با کاهش فشار داخل کره چشم
- ۱۵- چرا اثرات آنتی ترومبوتیک داروی آسپیرین بیشتر از دیگر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی است؟
 (۱) زیرا این دارو علاوه بر آنزیم COX-1، آنزیم COX-2 را نیز مهار می‌کند.
 (۲) زیرا نیمه عمر متابولیت‌های آن طولانی بوده و مدت‌ها در پلاکت‌ها باقی می‌مانند.
 (۳) زیرا این دارو آنزیم COX-1 را به صورت برگشت ناپذیر مهار می‌کند.
 (۴) چون تمایل این دارو به آنزیم COX موجود در پلاکت‌ها، بیش از سلول‌های دیگر است.
- ۱۶- کدام دارو به منظور کاهش دادن فشار داخل جمجمه‌ای (ICP) به کار گرفته می‌شود؟
 (۱) مانیتول (۲) تریامترن (۳) فوروزماید (۴) کلروتیازید
- ۱۷- دلیل سمیت انتخابی و عدم ایجاد اختلال در فرآیند ساخت اسیدهای نوکلئیک در سلول‌های استاندارد توسط سولفونامیدها کدام است؟
 (۱) زیرا سلول‌های استاندارد برای ساخت اسید فولیک نیازی به مصرف PABA ندارند.
 (۲) زیرا سلول‌های استاندارد PABA مورد نیاز برای ساخت اسید فولیک را خود می‌سازند.
 (۳) زیرا سلول‌های استاندارد خود قادر به ساخت اسید فولیک بوده و نیازی به PABA از منبع خارج سلولی ندارند.
 (۴) زیرا سلول‌های استاندارد اسید فولیک مورد نیاز خود را از مواد غذایی اخذ کرده و نیازی به PABA ندارند.
- ۱۸- منظور از «پنی‌سپلین‌های ضد استافیلوکوکی» کدام است؟
 (۱) آمینو پنی‌سپلین‌ها (۲) پنی‌سپلین‌های طبیعی
 (۳) پنی‌سپلین‌های وسیع الطیف (۴) پنی‌سپلین‌های مقاوم در برابر بتالاکتاماز
- ۱۹- آسیب غضروف مفصل از عوارض جانبی مهم کدام دارو است؟
 (۱) سولفاکینوکسالین (۲) تتراسایکلین (۳) انروفلوکساسین (۴) کلیندامایسین
- ۲۰- کدام یک از داروهای زیر دارای جذب گوارشی مناسب می‌باشد؟
 (۱) آموکسی سیلین (۲) استرپتومایسین (۳) تیکارسیلین (۴) پنی‌سپلین G
- ۲۱- کاربرد کدام داروی زیر برای درمان عفونت‌های ناشی از اجرام بی‌هوازی مناسب‌تر است؟
 (۱) دی‌هیدرواسترپتومایسین (۲) کانامایسین (۳) کلیندامایسین (۴) نئومایسین
- ۲۲- طیف ضد میکروبی کدام داروی زیر به طور عمده شامل اجرام گرم مثبت می‌باشد؟
 (۱) دی‌هیدرواسترپتومایسین (۲) انروفلوکساسین (۳) یلی میکسین B (۴) ونکومایسین
- ۲۳- کدام دارو از طریق ممانعت از سنتز دیواره سلولی عمل می‌کند؟
 (۱) تیامولین (۲) باسیتراسین (۳) اریترومایسین (۴) کولیستین

- ۲۴- آپورمکتین از چه طریقی اثر ضد کرم خود را اعمال می‌کند؟
 (۱) ایجاد فلج اسپاستیک
 (۲) تخلیه انرژی با افزایش مصرف گلوکز
 (۳) فعال کردن دریچه کلر وابسته به گلوتامات
 (۴) بلوک دیپولاریزان گیرنده‌های نیکوتینی
- ۲۵- مؤثرترین داروهای درمان هایپرآسیدیتة معده کدام است؟
 (۱) آنتی اسیدها
 (۲) مهارکننده‌های پمپ پروتون
 (۳) داروهای H_2 بلوکر
 (۴) داروهای آنتی کولینرژیک موسکارینی
- ۲۶- اثر بیهوش کنندگی کدام دارو سریع‌تر از بقیه می‌باشد؟
 (۱) کلورفرم
 (۲) هالوتان
 (۳) نیتروس اکساید (N_2O)
 (۴) متوکسی فلوران
- ۲۷- کدام دارو روی گیرنده‌های گابا بی تأثیر است؟
 (۱) دیازپام
 (۲) پروپوفول
 (۳) تیوپنتال
 (۴) کلرپرومازین
- ۲۸- اثرات آرام‌بخشی کدام دارو از طریق تأثیر بر گیرنده‌های α_2 بروز می‌کند؟
 (۱) دی‌متیدین
 (۲) آسه پرومازین
 (۳) هالوپریدول
 (۴) میدازولام
- ۲۹- کدام داروی زیر فاقد اثر شل کنندگی می‌باشد؟
 (۱) پروپوفول
 (۲) تیوپنتال
 (۳) کتامین
 (۴) زایلازین
- ۳۰- فلومازنیل آنتاگونیست کدام ترکیب می‌باشد؟
 (۱) دیازپام
 (۲) آسه پرومازین
 (۳) فنوباریتال
 (۴) زایلازین
- ۳۱- نام دارویی که در مسمومیت با آتروپین می‌توان بکار برد کدام است؟
 (۱) دی‌توبوکورارین
 (۲) فیزوستیگمین
 (۳) هیوسین
 (۴) نتوستیگمین
- ۳۲- کدام داروی کولینرژیک زیر بر دستگاه ادراری گوشتخواران اثر بیشتری دارد؟
 (۱) موسکارین
 (۲) متاکولین
 (۳) پیلوکارپین
 (۴) بتانکول
- ۳۳- اثر واژگونی ایمی‌نفرین در حضور کدام دارو ظاهر می‌گردد؟
 (۱) پروپرانولول
 (۲) کلرپرومازین
 (۳) ایزوپروتینول
 (۴) فنیل افرین
- ۳۴- نحوه محاسبه زمان رسیدن به حالت پایداری غلظت دارو در بدن عبارت است از:
 (۱) پنج برابر نیمه عمر دارو
 (۲) زمانی است که غلظت دارو به نصف می‌رسد
 (۳) حاصل تقسیم T_{max} بر نیمه عمر دارو
 (۴) حاصل تقسیم نیمه عمر بر ثابت سرعت حذف
- ۳۵- کدام یک از گزینه‌های زیر به ترتیب یک داروی آگونیست، آنتاگونیست مطلق و آگونیست نسبی گیرنده‌های اوپیوئیدی را نشان می‌دهد؟
 (۱) مرفین، کدئین و نالرفین
 (۲) کدئین، نالرفین و نالوکسان
 (۳) مرفین، نالوکسان و نالرفین
 (۴) نالرفین، نالوکسان و کدئین
- ۳۶- ضریب درمانی دارو (Therapeutic Index) عبارت است از:
 (۱) فاصله بین LD_{50} با ED_{50} دارو
 (۲) تقسیم LD_{50} بر فاکتور ایمنی 5
 (۳) حاصل تقسیم غلظت درمانی بر غلظت سمی دارو
 (۴) تقسیم LD_{50} بر ED_{50} دارو
- ۳۷- اثر داروی Captopril کدام است؟
 (۱) جلوگیری از تشکیل Angiotensin II
 (۲) مهار گیرنده Angiotensin II
 (۳) جلوگیری از تشکیل Angiotensin I
 (۴) مهار فعالیت Angiotensin I

- ۳۸- هدف از تجویز **Clavulanic acid** همراه با **Amoxicillin** کدام است؟
 (۱) تأخیر در جذب آموکسی سیلین
 (۲) جلوگیری از متابولیسم کبدی آموکسی سیلین
 (۳) تأخیر در دفع آموکسی سیلین
 (۴) افزایش طیف اثر آموکسی سیلین
- ۳۹- اثر **Sucralfate** در درمان زخم معده کدام است؟
 (۱) کاهش میزان اسید
 (۲) افزایش خون‌رسانی مخاط
 (۳) محافظت مخاط گوارشی
 (۴) خنثی کردن اسید
- ۴۰- کدام ترکیب دارویی به عنوان ضد اسهال استفاده می‌شود؟
 (۱) امپرازول
 (۲) دیفنوکسیلات
 (۳) پنتازوسین
 (۴) میریدین
- ۴۱- فنوتیازین‌ها با مهار کدام گیرنده مانع از استفراغ می‌شوند؟
 (۱) سروتونین
 (۲) نور اپی نفرین
 (۳) دوپامین
 (۴) استیل کولین
- ۴۲- کدام داروی ضد میکروبی طیف اثر باریک‌تری دارد؟
 (۱) Sulfamethazine
 (۲) Polymyxin B
 (۳) Chloramphenicol
 (۴) Tetracycline
- ۴۳- کدام دارو یک پاراسمپاتومیتیک غیر مستقیم (اثر می‌باشد)؟
 (۱) Neostigmine
 (۲) Carbachol
 (۳) Pilocarpine
 (۴) Methacholine
- ۴۴- کدام ماده آنتاگونیست فیزیولوژیک ترومبوگزان A_2 می‌باشد؟
 (۱) PGH_2
 (۲) PGF_2
 (۳) PGI_2
 (۴) $PGF_{2\alpha}$
- ۴۵- عمل کدام دارو بر اساس رقابت با آلدوسترون می‌باشد؟
 (۱) Spironolactone
 (۲) Chlorothiazide
 (۳) Furosemide
 (۴) Acetazolamide
- ۴۶- کدام دارو برای درمان گلووی با نشانه‌های تب بالا، زردی، خونریزی پتشی در غشاهای مخاطی و بزرگ شدن غده‌های لنفاوی انتخابی می‌باشد؟
 (۱) Halofuginone
 (۲) Imidocarb
 (۳) Oxytetracycline
 (۴) Buparvaquone
- ۴۷- چنانچه pH محیط به میزان ۲ واحد بیشتر از pK_a یک داروی اسیدی ضعیف باشد، نسبت غلظت فرم یونیزه به غیر یونیزه این دارو برابر است با:
 (۱) $\frac{1}{10}$
 (۲) $\frac{100}{1}$
 (۳) $\frac{1}{100}$
 (۴) $\frac{10}{1}$
- ۴۸- به طور کلی نیمه عمر داروها در کدام موجودات طولانی‌تر می‌باشد؟
 (۱) انسان‌ها
 (۲) پرندگان
 (۳) ماهیان
 (۴) نشخوارکنندگان
- ۴۹- کدام یکی از آمینو گلیکوزیدهای زیر برای درمان عفونت ناشی از سودوموناس آئروژینوزا کاربرد دارد؟
 (۱) Amikacin
 (۲) Apramycin
 (۳) Kanamycin
 (۴) Neomycin
- ۵۰- کدام یک از موارد زیر از اثرات سوء کورتیکوستروئیدها می‌باشند؟
 (۱) سقط جنین در اوایل (بستنی)
 (۲) هیپرنروفی آدرنال
 (۳) کاهش گویچه‌های قرمز
 (۴) کاهش لنفوسیت‌ها
- ۵۱- کدام مدر سبب دفع ادرار قلیایی می‌شود و خاصیت ادرار آوری آن کم است؟
 (۱) متولازون
 (۲) استازولامید
 (۳) تریامترن
 (۴) بوتتاناید

- ۵۲- پاسخ مربوط به تحریک کدام یک از رستپورهای زیر سریع تر ایجاد می شود؟
 (۱) رستپورهای کولیرژیک نیکوتینی موجود در گانگلیون های سمپاتیک
 (۲) رستپورهای β_2 آدرنرژیک موجود در مجاری هوایی
 (۳) رستپورهای هورمون T_3 موجود در سلول های کبد
 (۴) رستپورهای انسولین موجود در بافت چربی
- ۵۳- افزایش اشتها از اثرات کدام دارو است؟
 (۱) هالوپریدول (۲) کدینین (۳) تیوپنتال (۴) دیازپام
- ۵۴- عوارض کدام داروی حشره کش در حیوانات، مشابه اثرات xylazine می باشد؟
 (۱) پرمترین (۲) آمیتراز (۳) لیندان (۴) روتنون
- ۵۵- کدام یک از داروهای بی حس کننده موضعی دارای بیشترین طول اثر است؟
 (۱) لیدوکائین (۲) مپی واکائین (۳) پریلوکائین (۴) بوپی واکائین
- ۵۶- اعتیاد و ایدئو سنکرازی به ترتیب یعنی:
 (۱) تحمل اکتسابی و عدم تحمل مادرزادی (۲) عدم تحمل اکتسابی و تحمل طبیعی
 (۳) تحمل طبیعی و عدم تحمل اکتسابی (۴) تحمل طبیعی و التواء آنزیمی
- ۵۷- به عنوان درمان جایگزین در موارد آلودگی به انگل همونکوس کونتورتوس مقاوم نسبت به آیورمکتین، و لوامیزول کدام یک از داروهای زیر قابل استفاده می باشد؟
 (۱) نیتروکسینیل (۲) کلرسولون (۳) کلوزانتل (۴) تری کلایندازول
- ۵۸- در زمان کورتیکوتراپی طولانی مدت، تجویز جیره پروتئینی به چه منظور در بیمار توصیه می شود؟
 (۱) التیام زخم ها (۲) جبران تحلیل عضلانی
 (۳) جلوگیری از زخم لوله گوارش (۴) جبران کاهش قند خون
- ۵۹- از Gonadorelin به عنوان یک فرآورده سنتتیک GnRH در کدام یک از موارد زیر در دامپزشکی استفاده می شود؟
 (۱) القای زایمان (۲) عقیم کردن شیمیایی (۳) کیست تخمدانی (۴) درمان جفت ماندگی
- ۶۰- در تجویز کدام دارو همراه با دیگوکسین باید احتیاط کرد؟
 (۱) اسپیرونولاکتون (۲) فوروسماید (۳) میلریتون (۴) هیدرالازین

میکروبیولوژی:

- ۶۱- پدیده مهم ترین راه انتقال مقاومت های آنتی بیوتیکی توسط می باشد.
 (۱) ترانسدوکسیون عمومی - فاز (۲) ترانسدوکسیون اختصاصی - فاز
 (۳) کونژوگاسیون - پلاسمید R (۴) کونژوگاسیون - پلاسمید F
- ۶۲- در کنورسیون، ژن در داخل کدام یک قرار دارد؟
 (۱) پلاسمید (۲) فاز (۳) فازمید (۴) کروموزوم
- ۶۳- ترانسپوزون ها (Transposons) چگونه عواملی هستند؟
 (۱) در ترانسفورماسیون نقش عمده دارند.
 (۲) فقط در بعضی از باکتری های تر وجود دارند.
 (۳) قابلیت انتقال از یک پلاسمید به پلاسمید دیگر را دارند.
 (۴) در سویه های غیر بیمارزا هیچ گاه وجود ندارند.

- ۶۴- کدام آنتی‌بیوتیک باعث ساخته شدن پروتئین‌های ناکارآمد می‌شود؟
 (۱) پنی‌سیلین G (۲) تتراسایکلین (۳) سفالکسین (۴) استرپتومایسین
- ۶۵- کدام ترکیب فقط در باکتری‌های گرم مثبت وجود دارد؟
 (۱) گلیکولپید (۲) فسفولیپید (۳) پپتیدوگلیکان (۴) ریبیتول تکونیک اسید
- ۶۶- حساسیت باکتری‌ها به عوامل ضد میکروبی در کدام یک از مراحل زیر بیشتر است؟
 (۱) Lag phase (۲) Death phase (۳) Logarithmic phase (۴) Stationary phase
- ۶۷- واکنش کدام بیماری از نوع توکسوئید است؟
 (۱) کزاز (۲) تب برفکی (۳) شاربین (۴) نیوکاسل
- ۶۸- کدام آنتی‌بیوتیک مشابهت ساختمانی با D - آلائین پپتیدوگلیکان دارد؟
 (۱) اریترومایسین (۲) سیکلوسرین (۳) باسیتراسین (۴) ونکومایسین
- ۶۹- سالمونلا تیفی موریومی که در آزمون موتان زایی مواد (Ames test) به کار می‌رود به کدام ترکیب نیازمند است؟
 (۱) بیوتین (۲) هیستامین (۳) تریپتوفان (۴) هیستیدین
- ۷۰- کدام ماده از تشکیل پیوندهای متقاطع پپتیدی در پپتیدوگلیکان باکتری‌ها جلوگیری می‌کند؟
 (۱) لیزواستافین (۲) تتراسایکلین (۳) لیزوزیم (۴) کوتریموکسازول

سم‌شناسی:

- ۷۱- شایع‌ترین علامت پس از مرگ در موارد مسمومیت با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، کدام است؟
 (۱) هیپاتیت (۲) تقریب بینایی (۳) ضایعات لوله گوارش (۴) نکرورز بافت‌های لنفاوی
- ۷۲- افزایش ریسک ناهنجاری‌های جنینی در مصرف همزمان فنی‌توئین و والپروئیک اسید ناشی از کدام مورد است؟
 (۱) مهار آنزیم هیستون داستیلاز (۲) بلوک کانال‌های پتاسیمی (۳) خاصیت پروتئین بایندینگ زیاد (۴) بلوک کانال‌های HERG و ایجاد آریتمی
- ۷۳- در موارد مسمومیت با داروی آیورمکتین، کدام یک از اقدامات زیر انجام می‌شود؟
 (۱) درمان حمایتی و علامتی (۲) استفاده از آتروپین (۳) استفاده از یوهیمبین (۴) استفاده از ترکیبات شلاته‌کننده
- ۷۴- Gun metal Kidney از علائم مسمومیت با کدام فلز در گوسفندان است؟
 (۱) سرب (۲) مس (۳) کادمیوم (۴) آلومینیوم
- ۷۵- سگی را با علائم کوچک شدن مردمک چشم، تهوع، سیانوز، تنفس سطحی و آهسته به درمانگاه آورده‌اند، تشخیص اولیه، مسمومیت با کدام دارو است؟
 (۱) دیفن‌هیدرامین (۲) آتروپین (۳) اسپیرین (۴) مرفین
- ۷۶- سندرم‌های Gray و Red-neck به ترتیب با کدام یک از داروهای زیر مشاهده می‌شود؟
 (۱) تتراسایکلین و لینکومایسین (۲) تتراسایکلین و ونکومایسین (۳) کلرامفنیکل و ونکومایسین (۴) کلرامفنیکل و کوتتری موکسازول
- ۷۷- مسمومیت ناشی از جیوه فلزی از چه طریقی ایجاد می‌شود؟
 (۱) پوستی (۲) استنشاقی (۳) مخاطی (۴) خوراکی

- ۷۸- مهم ترین مکان تأثیر «نوروتوکسین بوتولینوم» کدام است؟
 (۱) سیستم عصبی مرکزی
 (۲) پایانه های عصبی پاراسمپاتیک
 (۳) سیناپس عصبی - عضلانی
 (۴) گانگلیون های اعصاب خودمختار
- ۷۹- کدام ترکیب در ایجاد نکرور حاد توپول های کلیوی در موارد مسمومیت با اتیلن گلیکول، نقش اصلی را برعهده دارد؟
 (۱) گلیکولیک اسید و اگزالات
 (۲) گلو تارآلدهید و اگزالات
 (۳) ترکیب اصلی اتیلن گلیکول
 (۴) اسید فرمیک و ترکیب اصلی اتیلن گلیکول
- ۸۰- در مسمومیت ها، برای شستشوی معده از کدام مورد استفاده می شود؟
 (۱) محلول رینگر
 (۲) نرمال سالین
 (۳) محلول دکستروز هیپرتونیک
 (۴) محلول الکترولیت پلی اتیلن گلیکول

بیماری های دام، طیور و آبزیان:

- ۸۱- نخستین آنتی بادی تولیدی طیور متعاقب ایمن سازی اولیه کدام ایمونوگلوبولین می باشد؟
 (۱) IgA (۲) IgG (۳) IgM (۴) IgY
- ۸۲- کدام مورد از علل کاهش تعداد ضربان قلب می باشد؟
 (۱) کاهش منیزیم خون (۲) کاهش کلسیم خون (۳) هیپرتروفی قلب (۴) آنمی ها
- ۸۳- وقوع اوتیت خارجی مزمن همراه با اریتماتوز بخش مقعر لاله گوش و تولید سرومن، مشخصه کدام یک از بیماری های زیر است؟
 (۱) هیپوتیروئیدسم (۲) دیسپلازی فولیکولی (۳) درماتیت آلرژیک تماسی (۴) درماتیت آتوپیک
- ۸۴- در پاراکراتوز، ضایعه در کدام قسمت پوست وجود دارد و مهم ترین عامل آن چیست؟
 (۱) هیپودرم - آلودگی به جرب (۲) درم - کمبود مس
 (۳) اپیدرم - کمبود روی (۴) اپیدرم - کمبود ویتامین A
- ۸۵- در هنگام گوش کردن ریه ها، در کدام حالت از شدت صداهای ریوی کاسته می شود؟
 (۱) فعالیت بدنی شدید (۲) آبسه ریوی (۳) اوایل پرخونی ریوی (۴) اوایل پنومونی ها
- ۸۶- مهم ترین عامل افزایش فشارخون ورید باب و ایجاد آسیت متعاقب آن در سگ ها کدام است؟
 (۱) نارسایی احتقانی قلب (۲) کولستاز
 (۳) یک ضایعه فراگیر نظیر تومور (۴) چرخش و جابجایی اعضای مجاور
- ۸۷- زئوسپور (Zoospore) به چه معناست؟
 (۱) هاگ مقاوم باکتری (۲) هاگ متحرک قارچ (۳) هاگ میکروسپورییدی (۴) هاگ میکسوسپورییدی
- ۸۸- کمبود کدام یک از ترکیبات زیر باعث کبد چرب می شود؟
 (۱) کولین (۲) ویتامین A (۳) ویتامین K (۴) اسید فولیک
- ۸۹- کدام ویتامین در پیشگیری از بروز سندرم آسیت در جوجه های گوشتی مؤثر است؟
 (۱) ویتامین B_۱ (۲) ویتامین D_۳ (۳) ویتامین K (۴) ویتامین C
- ۹۰- مصرف کدام کوکسیدواستات در هوای گرم سبب افزایش تلفات گرمزدگی در جوجه های گوشتی می شود؟
 (۱) مونسین (۲) آمپرولیوم (۳) نیکارباژین (۴) لازالوسید